


Crushing Ciprofloxacin Pills for Your Child

- For child who weighs less than 73 pounds, you should crush the pill and mix it with a liquid. This will make it easier to give your child the correct amount.
- The amount of medicine depends on the child's weight. Give the amount marked below for your child.
- Give two doses each day. Give one in the morning and one in the evening.
- To make it taste better, the liquid medicine can be mixed with a **small amount** of food or juice. **Be sure the child takes all this mixture to get the full dose of medicine.**

You will need:

- 1 Ciprofloxacin 500mg pill
- Metal spoon to crush the pill
- Measuring teaspoon
- Small bowl or cup
- 2 teaspoons of water



Follow these steps:

1. Put the Ciprofloxacin pill into a small bowl or cup.
2. Use the measuring teaspoon to **add 2 teaspoons** of water to the bowl. Let the pill sit in the liquid to soften.
3. **Crush the pill** with the back of the metal spoon until no large pieces are seen.
4. Stir the pill in the liquid for 1 minute to dissolve it.
5. **Measure the amount of liquid medicine** for your child's dose, as marked below. Stir or swirl the liquid to get it mixed well, then quickly use the syringe you were given to measure the dose.

Child's weight	Give this much liquid	How often each day
7-12 pounds (3-5 kg)	1 ml	Two times
13-22 pounds (6-10 kg)	2 ml	Two times
23-33 pounds (11-15 kg)	3 ml	Two times
34-44 pounds (16-20 kg)	4 ml	Two times
45-56 pounds (21-25 kg)	5 ml	Two times
57-72 pounds (26-32 kg)	7.5 ml	Two times
73 pounds or more (33 kg or more)	10 ml	Two times


- The liquid should be kept covered in the refrigerator between doses.
- Mix the pill with liquid each day and throw away unused portions at the end of the day. The medicine mixed with liquid will go bad after 1 day.

시프로플록사신 정제 으깨기

- 체중 33 kg(77 파운드) 미만 자녀에게 약을 먹일 때는 정제를 으갠 다음 액과 타 먹여야 합니다. 이렇게 해야 정확한 복용량을 자녀에게 주기가 수월합니다.
- 복용량은 자녀의 체중에 달려있습니다. 아래 표시한 복용량을 주십시오.
- 하루에 두 번 약을 주십시오. 아침에 한 번 저녁에 한 번 주십시오.
- 맛을 좀 더 좋게 하려면 물 약을 **약간의** 음식이나 주스에 섞어서 주어도 됩니다. **필요한 복용량을 모두 섭취하려면 섞은 액을 모두 마시도록 하십시오.**

필요한 품목:

- 500 mg 시프로플록사신 정제 한 알
- 정제를 으깨기 위한 금속 숟갈
- 측정 티스푼
- 작은 그릇이나 컵
- 2 테이블스푼 물



아래 단계를 따르십시오:

1. 시프로플록사신 정제를 작은 그릇이나 컵 안에 넣으십시오.
2. 측정용 티스푼을 이용하여 물 **2 티스푼**을 그릇 안에 **넣으십시오**. 정제를 물 속에 담가두십시오.
3. 금속 스푼을 이용하여 **정제를 눌러** 큰 덩어리가 없어질 때까지 **으깨십시오**.
4. 액 안에서 1분간 저어 물에 녹도록 하십시오.
5. **아래 표시한대로 자녀에게 먹일 복용량을 측정하십시오**. 액을 휘저어서 잘 섞은 다음, 병원에서 준 주사기를 이용하여 복용량을 곧 바로 측정하십시오.

자녀의 체중	액을 이 만큼 주십시오	하루에 얼마나 자주
3-5 kg (7-12 파운드)	1 ml	2 회
6-10 kg (13-22 파운드)	2 ml	2 회
11-15 kg (23-33 파운드)	3 ml	2 회
16-20 kg (34-44 파운드)	4 ml	2 회
21-25 kg (45-56 파운드)	5 ml	2 회
26-32 kg (57-72 파운드)	7.5 ml	2 회
33 kg 이상 (73 파운드 이상)	10 ml	2 회

- 남은 액은 잘 덮은 다음 냉장고에 보관하십시오.
- 매일 정제를 액과 섞어 사용하고, 남은 약은 저녁에 버리십시오. 액과 섞은 약은 하루가 지나면 상합니다.