

Doxycycline

You are being given this medicine because you may have been exposed to Anthrax. You will need to take this medicine for 60 days. You will be told how to get more medicine if it is needed.

Dosing Information

- Take the medicine every 12 hours or as directed.
- For 2 hours before and 2 hours after taking this medicine, do not take antacids or milk products or juices with added calcium. Antacids such as Tums, Rolaids or milk of magnesia, and milk products like milk, cheese or yogurt, and calcium can lessen how well the medicine works.
- Take the medicine with a full glass of water and eat some food so the medicine will not irritate your stomach.
- If you miss a dose, take the missed dose right away. If it is almost time to take your next dose, wait until then to take your medicine and skip the missed dose. Do not take two doses at the same time.
- You must keep taking your medicine for the full 60 days. You may become ill if you do not finish all your medicine.

Side Effects

- This medicine can cause upset stomach, vomiting, or diarrhea, but **you need to keep taking this medicine if any of these occur**. This medicine can make it easier to get a sunburn on your skin. Wear sunscreen.
- **Call your doctor right away** if you have:
 - shortness of breath
 - trouble breathing
 - swelling of the face, lips, tongue or throat

Interactions

- Birth control medicine may not work as well when you take Doxycycline. Use condoms for birth control when taking Doxycycline.
- If you take warfarin (Coumadin), digoxin, Accutane, lithium, insulin, methotrexate, barbiturates, phenytoin (Dilantin), carbamazepine (Tegretol), or rifampin, **call 211 or call your doctor to tell them that you are taking Doxycycline**. These medicines can cause problems if taken while taking Doxycycline.
- Do not use any herbs, especially St. John's Wort and Dong Quai while taking this medicine.

Doxiciclina

Usted debe recibir este medicamento porque es posible que haya estado expuesto al ántrax. Tendrá que tomarlo durante 60 días. Se le indicará cómo obtener más medicamentos si es necesario.

Información acerca de la dosis

- Tome el medicamento cada 12 horas o según lo indicado.
- Durante 2 horas antes y 2 horas después de tomar este medicamento, no tome antiácidos ni productos lácteos o jugos con calcio agregado. Los antiácidos, como Tums, Roloids o leche de magnesia y los productos lácteos, como leche, queso o yogur, y el calcio pueden disminuir el efecto del medicamento.
- Tome el medicamento con un vaso lleno de agua y coma algo para que el medicamento no le irrite el estómago.
- Si se salta una dosis, tómela inmediatamente. Si ya casi es hora de tomar la siguiente dosis, espere para tomarla y no se tome la que se saltó. No tome dos dosis al mismo tiempo.
- Debe seguir tomando el medicamento durante 60 días. Se puede enfermar si no termina de tomar su medicamento.

Efectos secundarios

- Este medicamento puede causar molestia estomacal, vómitos o diarrea, pero **debe seguir tomándolo si presenta cualquiera de estos síntomas**. Este medicamento puede hacerlo más propenso a tener quemaduras de sol en la piel. Use protector solar.
- **Llame a su médico de inmediato** si tiene:
 - falta de aire;
 - dificultad para respirar;
 - hinchazón del rostro, los labios, la lengua o la garganta.

Interacciones

- Es posible que los anticonceptivos no surtan buen efecto cuando toma doxiciclina. Use condones como método anticonceptivo cuando tome doxiciclina.
- Si toma warfarina (coumadina), digoxina, Accutane, litio, insulina, metotrexato, barbitúricos, fenitoína (Dilantin), carbamazepina (Tegretol) o rifampina, **llame al 211 o a su médico para informarle que está tomando doxiciclina**. Estos medicamentos pueden causar problemas si los toma mientras toma doxiciclina.
- No use hierbas, especialmente la hierba de San Juan y Dong Quai mientras toma este medicamento.