

Doxycycline

You are being given this medicine because you may have been exposed to Anthrax. You will need to take this medicine for 60 days. You will be told how to get more medicine if it is needed.

Dosing Information

- Take the medicine every 12 hours or as directed.
- For 2 hours before and 2 hours after taking this medicine, do not take antacids or milk products or juices with added calcium. Antacids such as Tums, Rolaids or milk of magnesia, and milk products like milk, cheese or yogurt, and calcium can lessen how well the medicine works.
- Take the medicine with a full glass of water and eat some food so the medicine will not irritate your stomach.
- If you miss a dose, take the missed dose right away. If it is almost time to take your next dose, wait until then to take your medicine and skip the missed dose. Do not take two doses at the same time.
- You must keep taking your medicine for the full 60 days. You may become ill if you do not finish all your medicine.

Side Effects

- This medicine can cause upset stomach, vomiting, or diarrhea, but **you need to keep taking this medicine if any of these occur.** This medicine can make it easier to get a sunburn on your skin. Wear sunscreen.
- **Call your doctor right away** if you have:
 - shortness of breath
 - trouble breathing
 - swelling of the face, lips, tongue or throat

Interactions

- Birth control medicine may not work as well when you take Doxycycline. Use condoms for birth control when taking Doxycycline.
- If you take warfarin (Coumadin), digoxin, Accutane, lithium, insulin, methotrexate, barbiturates, phenytoin (Dilantin), carbamazepine (Tegretol), or rifampin, **call 211 or call your doctor to tell them that you are taking Doxycycline.** These medicines can cause problems if taken while taking Doxycycline.
- Do not use any herbs, especially St. John's Wort and Dong Quai while taking this medicine.

Doxycycline

Quý vị được cho thuốc này vì có thể quý vị đã bị nhiễm bệnh than. Quý vị cần dùng thuốc này trong 60 ngày. Quý vị sẽ được chỉ dẫn cách lấy thêm thuốc nếu cần thiết.

Thông tin về liều lượng

- Dùng thuốc mỗi 12 giờ hay theo chỉ dẫn.
- Không dùng thuốc kháng axit hay các sản phẩm sữa hoặc nước ép trái cây có thêm canxi 2 giờ trước và sau khi uống thuốc này. Thuốc kháng axit như Tums, Roloids và sữa có magne, và các sản phẩm sữa như sữa, phô mai hay ya ua, và canxi có thể giảm tác dụng của thuốc.
- Uống thuốc với một ly nước đầy và dùng một ít thức ăn để thuốc không làm cồn cào bao tử.
- Nếu quý vị quên một liều thì dùng liều đó ngay. Nếu gần đến giờ dùng liều kế tiếp thì đợi đến lúc đó mới dùng và bỏ qua liều đã quên. Không dùng hai liều cùng một lúc.
- Quý vị phải tiếp tục dùng thuốc cho đủ 60 ngày. Quý vị có thể bị bệnh nếu không dùng hết thuốc.

Phản ứng phụ

- Thuốc này có thể gây khó chịu bao tử, ói mửa, tiêu chảy, nhưng **quý vị cần tiếp tục dùng thuốc này nếu bất cứ điều này xảy ra**. Thuốc này có thể làm cho da dễ ăn nắng, do đó hãy che nắng.
- **Gọi cho bác sĩ ngay** nếu quý vị:
 - thở ngắn
 - khó thở
 - sưng mặt, môi, lưỡi hay họng

Tương tác

- Thuốc ngừa thai có thể không có tác dụng tốt khi dùng với Doxycycline. Dùng bao cao su để ngừa thai khi uống Doxycycline.
- Nếu quý vị dùng warfarin (Coumadin), digoxin, Accutane, lithium, insulin, methotrexate, barbiturates, phenytoin (Dilantin), carbamazepine (Tegretol), hay rifampin, **gọi số 211 hay gọi cho bác sĩ để báo là quý vị dùng Doxycycline**. Những loại thuốc này có thể gây vấn đề nếu dùng cùng lúc với Doxycycline.
- Không dùng thảo dược, đặc biệt là St. John's Wort và dương quy trong khi dùng thuốc này.