



Giving Doxycycline Pills to Your Child



- The amount of medicine depends on the child's weight.
- For a child who weighs less than 55 pounds (25kg), you should use the Doxycycline Suspension for your child, not the pills. Please refer to that page for directions.
- **Give two doses each day. Give one in the morning and one in the evening.** Give the amount marked below for your child.
- To make it taste better, the medicine can be crushed and mixed with a **small amount** of food or juice. **Be sure the child takes all this mixture to get the full dose of medicine.**

Child's weight	Morning Dose Amount	Evening Dose Amount
Under 55 pounds (under 25 kg)	See the page about Doxycycline Suspension for medicine directions	
55-80 pounds (25-36 kg)	½ pill	½ pill
81-98 pounds (37-44 kg)	1 pill	½ pill
99 pounds or more (45kg or more)	1 pill	1 pill

अपने बच्चे को डॉक्सीसाइक्लिन गोलियां देना

- दवा की मात्रा बच्चे के वजन पर निर्भर करती है।
- 25 किग्रा (55 पौंड) से कम वजन वाले बच्चे के लिए, आपको डॉक्सीसाइक्लिन सस्पेंशन का प्रयोग करना चाहिए, गोलियों का नहीं। दिशा-निर्देशों के लिए कृपया वह पृष्ठ देखें।
- हर रोज दो खुराकें दें। एक खुराक सुबह और एक शाम को। अपने बच्चे को दवा की नीचे बताई गई मात्रा दें।
- स्वाद बेहतर बनाने के लिए, दवा को पीसकर भोजन या जूस की थोड़ी-सी मात्रा में मिलाया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि बच्चा इस पूरे मिश्रण को खा ले ताकि उसे दवा की पूरी खुराक मिल सके।

बच्चे का वजन	सुबह की खुराक की मात्रा	शाम की खुराक की मात्रा
25 किग्रा से कम (55 पौंड से कम)	दवा संबंधी दिशा-निर्देशों के लिए डॉक्सीसाइक्लाइन सस्पेंशन विषयक पृष्ठ देखें	
25–36 किग्रा (55–80 पौंड)	½ गोली	½ गोली
37–44 किग्रा (81–98 पौंड)	1 गोली	½ गोली
45 किग्रा या ज्यादा (99 पौंड या ज्यादा)	1 गोली	1 गोली