


Doxycycline Suspension for Babies


How to give Doxycycline Suspension To Your Child

- Mix the medicine as shown to the right.
- Shake the medicine for about 15 seconds before measuring out the next dose.
- After it is mixed, keep the medicine in the refrigerator. It may be kept covered in the refrigerator for 14 days.
- Measure the amount of liquid medicine for your child's dose, as marked below.
- Give 1 or 2 doses each day. Give the medicine in the morning. If your child is to have 2 doses each day, give the medicine in the evening also. Follow the schedule marked below for your child.
- To make it taste better, the suspension can be mixed with a small amount of food or juice. **Be sure the child takes all this mixture to get the full dose of medicine.**


Mixing Instructions




1. Open the bottle. Press down on the cap as you twist it to the left.



2. Measure 1.5 ounces of water in the medicine cup you were given. (45ml = 1.5 ounces)



3. Add the water to the medicine powder.




4. Close the bottle. Be sure the cap is on tight. Shake the bottle well for about 15 seconds. The medicine is ready for use.

Child's weight	Give this much liquid	How often each day
Under 12.5 pounds (<6 kg)	5 ml	One time
12.5-27 pounds (6-12 kg)	10 ml	One time
28-54 pounds (13-24 kg)	15 ml	One time


अपने बच्चे को डॉक्सीसाइक्लिन सस्पेंशन कैसे दें

- दाहिनी ओर दिखाई विधि से दवा मिश्रित करें।
- अगली खुराक को मापने से पहले दवा को लगभग 15 सेकेंड तक हिलाएं।
- मिश्रित हो जाने पर, दवा को रेफ्रिजरेटर में रख दें। इसे ढक्कर रेफ्रिजरेटर में 14 दिन तक रखा जा सकता है।
- अपने बच्चे की खुराक के लिए द्रव औषधि की मात्रा माप लें, जिस तरह नीचे बताया गया है।
- रोज 1 या 2 खुराक दें। दवा सुबह के समय पर दें। यदि आपके बच्चे को रोज 2 खुराकें देनी हों, तो शाम को भी दवा दें। अपने बच्चे को नीचे बताए गए कार्यक्रम के अनुसार दवा दें।
- स्वाद बेहतर बनाने के लिए, सस्पेंशन को भोजन या जूस की थोड़ी-सी मात्रा में मिलाया जा सकता है। **सुनिश्चित करें कि बच्चा इस पूरे मिश्रण को खा ले ताकि उसे दवा की पूरी खुराक मिल सके।**


मिलाने संबंधी निर्देश




1. शीशी खोल लें। ढक्कन को बाईं ओर मरोड़ते हुए नीचे दबाएं।



2. दवा के लिए आपको दिए गए कप में 1.5 औंस पानी मापकर डालें। (45 मिली = 1.5 औंस)



3. पाउडर रूप में मौजूद दवा में पानी मिलाएं।



4. शीशी को बंद कर दें। सुनिश्चित करें कि ढक्कन मजबूती से लगा है। शीशी को लगभग 15 सेकेंडों तक अच्छी तरह हिलाएं। प्रयोग हेतु दवा तैयार है।

बच्चे का वजन	इतनी मात्रा में द्रव दें	रोज कितनी बार
6 किग्रा से कम (12.5 पौंड से कम)	5 मिली	एक बार
6–12 किग्रा (12.5–27 पौंड)	10 मिली	एक बार
13–24 किग्रा (28–54 पौंड)	15 मिली	एक बार