


Doxycycline Suspension for Babies


How to give Doxycycline Suspension To Your Child

- Mix the medicine as shown to the right.
- Shake the medicine for about 15 seconds before measuring out the next dose.
- After it is mixed, keep the medicine in the refrigerator. It may be kept covered in the refrigerator for 14 days.
- Measure the amount of liquid medicine for your child's dose, as marked below.
- Give 1 or 2 doses each day. Give the medicine in the morning. If your child is to have 2 doses each day, give the medicine in the evening also. Follow the schedule marked below for your child.
- To make it taste better, the suspension can be mixed with a small amount of food or juice. **Be sure the child takes all this mixture to get the full dose of medicine.**


Mixing Instructions




1. Open the bottle. Press down on the cap as you twist it to the left.



2. Measure 1.5 ounces of water in the medicine cup you were given. (45ml = 1.5 ounces)



3. Add the water to the medicine powder.



4. Close the bottle. Be sure the cap is on tight. Shake the bottle well for about 15 seconds. The medicine is ready for use.


Child's weight	Give this much liquid	How often each day
Under 12.5 pounds (<6 kg)	5 ml	One time
12.5-27 pounds (6-12 kg)	10 ml	One time
28-54 pounds (13-24 kg)	15 ml	One time

아기들을 위한 독시사이클린 현탁액


아기에게 독시사이클린 현탁액을 먹이는 방법

- 오른쪽 그림과 같이 약을 섞으십시오.
- 복용량을 측정하기 전에 약을 15 초가량 흔들십시오.
- 혼합이 잘 되었으면 약을 냉장고에 보관하십시오. 뚜껑을 덮어두면 냉장고에 14 일까지 보관할 수도 있습니다.
- 아래 표시한대로 어린이에게 먹일 복용량을 측정하십시오.
- 하루에 약을 1 번 또는 2 번 주십시오. 아침에 약을 주십시오. 하루에 2 번 약을 먹는 경우, 저녁에도 약을 주십시오. 아래 표시한대로 주십시오.
- 맛을 좀 더 좋게 하려면 현탁액을 약간의 음식이나 주스와 섞어도 됩니다. **필요한 복용량을 모두 섭취하려면 섞은 액을 모두 마셔야 합니다.**


섞는 방법




1. 병을 연다. 캡을 꼭 누른 상태에서 왼쪽으로 비웁니다.



2. 병원에서 준 약 컵에 1.5 온스의 물을 넣습니다.
(45 ml = 1.5 온스)



3. 가루 약에 물을 탑니다.



4. 병을 닫습니다. 캡이 꼭 닫혔는가 확인합니다. 병을 약 15 초간 잘 흔들립니다. 이제 약을 사용할 준비가 되었습니다.

자녀의 체중	액을 이 만큼 주십시오	하루에 얼마나 자주
6 kg 미만 (12.5 파운드 미만)	5 ml	1 회
6-12 kg (12.5-27 파운드)	10 ml	1 회
13-24 kg (28-54 파운드)	15 ml	1 회