

فلو ویکسین کی ہر سال سفارش کی جاتی ہے۔ 6 ماہ سے 8 سال کے
بچوں کو ویکسین لینے کے پہلے سال دو خوراکیں لینی چاہئیں۔

فلو وائرس ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ ہر سال ان وائرسوں کے خلاف
ویکسین بنائی جاتی ہے جن کا اس سال بیماری پیدا کرنے کا سب سے
زیادہ امکان ہو۔ اگرچہ فلو ویکسین فلو کی تمام صورتوں کو نہیں روک
سکتی، تاہم بیماری کے خلاف یہ ہمارا بہترین دفاع ہے۔ غیر فعال شدہ فلو
ویکسین 3 یا 4 مختلف انفلونزا وائرسوں کے خلاف حفاظت کر سکتی
ہے۔

ویکسین لگانے کے بعد حفاظت پیدا ہونے میں تقریباً 2 ہفتے لگتے ہیں
اور یہ حفاظت کئی ماہ سے لے کر ایک سال تک رہتی ہے۔

بعض بیماریاں جو انفلونزا وائرسوں کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتیں، ان کو
غلطی سے فلو سمجھا جاتا ہے۔ فلو ویکسین ان بیماریوں کو نہیں روکے
گی۔ یہ صرف انفلونزا کو روک سکتی ہے۔

65 سال اور اس سے زائد عمر کے لوگوں کے لئے ایک "تیز خوراک"
ویکسین دستیاب ہے۔ آپ کو ویکسین لگانے والا شخص آپ کو اس کے
بارے میں مزید معلومات دے سکتا ہے۔

چند غیر فعال ویکسینوں میں تھانیمیروسال (Thimerosal) نامی پارے
پر مبنی تحفظی شامل ہوتا ہے۔ مطالعہ جات نے دکھایا ہے کہ ویکسین
میں تھانیمیروسال کی موجودگی نقصان دہ نہیں ہے، لیکن ایسی ویکسینیں
دستیاب ہیں جن میں تحفظی شامل نہیں ہوتا۔

3 بعض لوگوں کو یہ ویکسین نہیں لگوانی چاہئے

آپ کو جو شخص ویکسین لگانے اس کو بتا دیں:

- اگر آپ کو کوئی شدید (جان لیوا) الرجیا ہیں: اگر آپ کو کبھی
فلو ویکسین کی ایک خوراک سے کسی جان لیوا الرجی کا رد عمل
ہوا ہو یا آپ کو اس ویکسین کے کسی جزو سے شدید الرجی ہو تو
ہو سکتا ہے آپ کو اس کی خوراک نہ لگوانے کا مشورہ دیا
جائے۔ فلو ویکسین کی زیادہ تر اقسام میں، لیکن سب میں نہیں،
انڈے کی تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے۔
- اگر آپ کو کبھی Guillain-Barré Syndrome (GBS) نامی
فالج میں مبتلا کرنے والی ایک بیماری) کا عارضہ لاحق ہوا ہو۔
GBS کی سرگزشت کے حامل بعض لوگوں کو یہ ویکسین نہیں
لگوانی چاہئے۔ اس بارے میں آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تبادلہ
خیال کرنا چاہئے۔
- اگر آپ کی طبیعت ناساز ہو۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ٹھیک ہونے تک
انتظار کرنے کے لئے کہیں۔ لیکن آپ کو واپس آنا چاہئے۔

1 ویکسین کیوں لگوانی جائے

انفلونزا (فلو) ایک چھوت کی بیماری ہے جو ہر موسم سرما میں عموماً
اکتوبر اور مئی کے درمیان میں امریکہ بھر میں پھیلتی ہے۔

فلو انفلونزا وائرس سے پیدا ہوتا ہے، اور کھانسنے، چھینکنے، اور
قریبی رابطے سے پھیل سکتا ہے۔

فلو ہر ایک کو ہو سکتا ہے لیکن بچوں میں فلو ہونے کا خطرہ سب سے
زیادہ ہوتا ہے۔ علامات اچانک پیدا ہوتی ہیں اور کئی دنوں تک رہ سکتی
ہیں۔ ان میں شامل ہو سکتی ہیں:

- بخار/کپکپی
- گلے میں خراش
- پٹھوں میں درد
- تھکاوٹ
- کھانسی
- سردرد
- ناک بہنا یا بند ہونا

فلو سے کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ ان
لوگوں میں چھوٹے بچے، 65 سال اور اس سے زائد عمر کے لوگ،
حاملہ خواتین، اور صحت سے متعلق عوارض جیسے دل، پھیپھڑے
اور گردے کی بیماری میں مبتلا یا کمزور مامونیتی نظام کے حامل لوگ
شامل ہیں۔ فلو ویکسین ان لوگوں اور ان کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے
والوں کے لئے خصوصی طور پر اہم ہے۔

فلو کے نتیجے میں نمونیا ہو سکتا ہے، اور یہ موجودہ طبی حالات کو
ابتد کر سکتا ہے۔ یہ بچوں میں اسپہال اور دورے پیدا کر سکتا ہے۔

ہر سال امریکہ میں ہزاروں لوگ فلو سے مر جاتے ہیں اور اس سے
زیادہ لوگ ہسپتالوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔

فلو ویکسین ہی ہمارے پاس فلو اور اس کی پیچیدگیوں کے خلاف بہترین
حفاظت ہے۔ فلو ویکسین فلو کو ایک شخص سے دوسرے شخص تک
پھیلنے سے بھی روکتی ہے۔

2 غیر فعال شدہ فلو ویکسین

انفلونزا ویکسین کی دو اقسام ہیں:

آپ ایک غیر فعال شدہ فلو ویکسین لے رہے ہیں جس میں کوئی زندہ
انفلونزا وائرس شامل نہیں ہے۔ اس کو سونی کے ساتھ ایک ٹیکے کی
صورت میں لگایا جاتا ہے، اور اسے اکثر "فلو شاٹ" کہتے ہیں۔

ایک مختلف زندہ، ضعیف (کمزور شدہ) انفلونزا ویکسین کا چھڑکاؤ
نتہنوں میں کیا جاتا ہے۔ اس ویکسین کو ایک علیحدہ ویکسین کے
معلوماتی بیان میں بیان کیا گیا ہے۔

ایک ویکسین کے ساتھ، کسی دوا کی طرح، ضمنی اثرات کا امکان ہوتا ہے۔ یہ عموماً ہلکے ہوتے ہیں اور خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔

خطرناک ضمنی اثرات بھی ممکن ہیں، لیکن بہت شاذو نادر ہوتے ہیں۔ غیر فعال شدہ فلو ویکسین میں زندہ وائرس نہیں ہوتے، اس لئے اس ویکسین سے فلو میں مبتلا ہونا ممکن نہیں۔

کسی طبی طریقہ کار، بشمول ویکسین لگانے کے بعد غشی کے مختصر دورے اور متعلقہ علامات (جیسے جھٹکے والی حرکات) پیدا ہو سکتی ہیں۔ ویکسین لگوانے کے بعد تقریباً 15 منٹ تک بیٹھنے یا لیٹنے سے غش کھاتے یا گرنے کے باعث چوٹ لگنے سے پرہیز کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو چکر آئیں یا سرگرائی یا بینائی میں تبدیلیاں محسوس ہوں یا کانوں میں گھنٹیاں بجیں تو اپنے ڈاکٹر کو بتائیں۔

غیر فعال شدہ فلو ویکسین کے بعد ہلکے مسائل:

- ٹیکہ لگانے کی جگہ پر ڈکھن، سرخی یا ورم
- آواز کا بیٹھ جانا؛ آنکھوں میں ڈکھن یا خارش، کھانسی
- بخار
- ٹیسیں
- سر درد
- خارش
- تھکاوٹ

اگر یہ مسائل پیدا ہو جائیں تو یہ عموماً ٹیکہ لگنے کے بعد جلد ہی شروع ہو جاتے ہیں اور 1 یا 2 دنوں تک رہتے ہیں۔

غیر فعال شدہ فلو ویکسین کے بعد معتدل مسائل:

- چھوٹے بچے جو غیر فعال شدہ ویکسین اور نیوموکول ویکسین (PCV13) ایک ہی وقت میں لیتے ہیں، کو بخار کے باعث ہونے والے دوروں کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لئے اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں۔ اگر فلو ویکسین لگوانے والے کسی بچے کو کبھی دورہ پڑا ہو تو اپنے ڈاکٹر کو بتائیں۔

غیر فعال شدہ فلو ویکسین کے بعد شدید مسائل:

- کسی ویکسین کے بعد (اندازاً ایک ملین خوراکوں میں سے ایک میں) ایک شدید الرجی کا رد عمل پیدا ہو سکتا ہے۔
- تھوڑا سا امکان ہے کہ فلو ویکسین -Guillain-Barré Syndrome (GBS) سے مربوط ہو سکتی ہے، ویکسین لگوانے والے ایک ملین افراد میں سے 1 یا 2 صورتوں سے زیادہ نہیں۔ یہ فلو ویکسین کی خطرناک پیچیدگیوں کے خطرے کی نسبت بہت کم ہے جن سے فلو ویکسین کے ذریعے پرہیز کیا جا سکتا ہے۔

ویکسین کی حفاظت کی ہمیشہ نگرانی کی جاتی ہے۔ مزید معلومات کے لئے ملاحظہ کریں: www.cdc.gov/vaccinesafety/

مجھے کس چیز پر نظر رکھنی چاہئے؟

- جس چیز سے آپ کو تشویش ہو اس پر نظر رکھیں، جیسے الرجی کے ایک خطرناک رد عمل کی علامات، بہت تیز بخار، یا روئے میں تبدیلیاں۔

الرجی کے ایک خطرناک رد عمل کی علامات میں شامل ہو سکتی ہیں، چھپاکی، چہرے اور گلے کی سوجن، سانس لینے میں دشواری، دل کی دھڑکن میں تیزی، سر چکرانا، اور کمزوری۔ یہ ویکسین لگوانے کے چند منٹوں سے لے کے چند گھنٹوں کے بعد شروع ہوتی ہیں۔

مجھے کیا کرنا چاہئے؟

- اگر آپ کا خیال ہو کہ یہ ایک شدید الرجی کا رد عمل ہے یا کوئی دوسری ہنگامی حالت ہے جس میں انتظار نہیں کیا جا سکتا، تو 1-1-9 پر فون کریں یا اس شخص کو نزدیکی ہسپتال میں لے جائیں۔ ورنہ، اپنے ڈاکٹر کو فون کریں۔

- اس کے بعد، اس رد عمل کی اطلاع ویکسین کے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع دینے کے نظام (VAERS) کو دینی چاہئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ڈاکٹر یہ رپورٹ دائر کر دے یا آپ VAERS کی ویب سائٹ www.vaers.hhs.gov کے ذریعے یا 1-800-822-7967 پر فون کر کے یہ کام خود کر سکتے ہیں۔

VAERS صرف رد عمل کی اطلاع دینے کے لئے ہے وہ طبی مشورہ نہیں دیتے۔

ویکسین سے نقصان کے معاوضے کا قومی پروگرام (VICP) ایک وفاقی پروگرام ہے جسے ان لوگوں کو معاوضہ دینے کے لئے تخلیق کیا گیا تھا جنہیں، ہو سکتا ہے، بعض ویکسینوں کی وجہ سے نقصان پہنچا ہو۔

وہ لوگ جن کا خیال ہو کہ، ہو سکتا ہے، انہیں کسی ویکسین سے نقصان پہنچا ہے، 1-800-338-2382 پر فون کر کے یا VICP کی ویب سائٹ www.hrsa.gov/vaccinecompensation کو ملاحظہ کر کے پروگرام کے بارے میں اور ایک دعویٰ دائر کرنے کے بارے میں جان سکتے ہیں۔

- اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں۔
- اپنے مقامی یا ریاستی محکمہ صحت کو فون کریں۔
- مرض کے قابو اور پرہیز کے مراکز (CDC) سے رابطہ کریں: 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) پر فون کریں یا CDC کی ویب سائٹ www.cdc.gov/flu ملاحظہ کریں۔

ویکسین کا معلوماتی بیان (عبوری)
غیر فعال شدہ انفلوئنزا ویکسین

صرف
کینے

Office Use Only



07/26/2013

42 U.S.C. § 300aa-26

Influenza (inactivated) VIS - Urdu

Translation provided by the New York City Department of Health and Mental Hygiene