

Warning!

If you are taking any medicines on this list, you need to **call 211 or your doctor right away.**

- Digoxin – a heart medicine
- Probenecid – for gout
- Diabetes medicines, insulin or pills
- Rifampin – for tuberculosis
- Coumadin or warfarin – blood thinner
- Accutane – for acne
- Theophylline – a breathing medicine
- Dilantin, barbiturates, or carbamazepine – seizure medicines
- Lithium – for mental health
- Cyclosporine – for immune system problems
- Methotrexate – for arthritis, cancer, psoriasis or lupus
- Requip – for Parkinson’s disease

Taking the emergency antibiotics with any of these medicines may cause serious, even life threatening, side effects.

Your doctor may want to change the medicine or the amount you take, or the doctor may want you to have more tests.

경고!

이 목록에 있는 약들 중 하나라도 들고 계시다면, 즉시 211 또는 의사에게 전화하십시오.

- 디고신 - 심장약
- 프로베네시드 - 통풍에 먹는 약
- 당뇨에 먹는 약, 인슐린 또는 정제
- 리팜핀 - 폐결핵에 먹는 약
- 쿠바딘 또는 와파린 - 혈액 묽게 하는 약
- 애큐테인 - 여드름 약
- 티오필린 - 호흡약
- 딜란틴, 바비투레이트, 또는 카바마제파인 - 발작에 먹는 약
- 리튬 - 정신 건강약
- 사이클로스포린 - 면역체제 문제
- 메토트렉세이트 - 관절염, 암, 건선 또는 낭창
- 리킵 - 파킨슨스 병

이 약들 중 하나와 응급 항생제를 함께 먹으면 심각한 부작용, 심지어는 목숨까지 위태로울 수도 있습니다.

귀하의 의사는 약을 바꾸거나, 복용량을 바꾸기를 원하거나 또는 좀 더 검사를 해보기 원할 수도 있습니다.